

# Baccalauréat Blanc

## Mathématiques

Terminale S

### Enseignement obligatoire

- Durée de l'épreuve : 4 heures
- Coefficient 7

*Ce sujet comporte 4 exercices.*

*L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.*

*Le candidat veillera à ce que lui soit remis le sujet  
correspondant à sa spécialité.*

*La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans  
l'appréciation des copies.*

### Exercice 1 : 4 points

$(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  un repère orthonormal de l'espace.

On note  $\mathcal{D}$  la droite dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Soit  $\mathcal{P}$  le plan d'équation  $x + y + 2z - 1 = 0$ .

Soit  $\mathcal{S}$  la sphère de centre  $B(1; -1; 0)$  et de rayon 1.

*Pour chacune des phrases ci-dessous une seule des trois propositions est exacte. Dans chaque cas, indiquer laquelle des trois réponses est juste en justifiant soigneusement votre choix.*

*Il est attribué pour chaque question 0,5 point pour chaque réponse et 0,5 point si la justification est correcte.*

1. La droite  $\mathcal{D}$  et le plan  $\mathcal{P}$  sont :
  - a. parallèles ;
  - b. perpendiculaires ;
  - c. non parallèles, non perpendiculaires.
2. Soit  $\mathcal{P}'$  le plan contenant la droite  $\mathcal{D}$  et perpendiculaire au plan  $\mathcal{P}$ . Le plan  $\mathcal{P}'$  admet pour équation cartésienne :
  - a.  $-2y + z + 2 = 0$  ;
  - b.  $2x - z = 0$  ;
  - c.  $x - y - z = 0$ .
3. La droite  $\Delta$ , intersection du plan  $\mathcal{P}$  et du plan d'équation  $2x - z = 0$  admet pour équation paramétrique :
  - a.  $\begin{cases} x = t \\ y = -3t + 1 \\ z = 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$
  - b.  $\begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$
  - c.  $\begin{cases} x = t \\ y = -5t + 1 \\ z = 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$
4. L'intersection de la sphère  $\mathcal{S}$  et du plan  $\mathcal{P}$  est :
  - a. un point ;
  - b. un cercle ;
  - c. l'ensemble vide.

## Exercice 2 : 5 points

**Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité.**

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

On considère les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives :

$$z_A = \sqrt{3} + i ; z_B = -1 + i\sqrt{3} ; z_C = -1 - 3i.$$

On note  $D$  l'image du point  $C$  par la rotation de centre  $O$  et d'angle de mesure  $\frac{\pi}{2}$ .

On note  $E$  l'image du point  $B$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{OC}$ .

1.
  - a. Ecrire les nombres complexes  $z_A$  et  $z_B$  sous forme exponentielle.
  - b. Sur une feuille de papier millimétré, en prenant comme unité graphique 2 cm, placer les points  $A, B$  et  $C$ .
  - c. Démontrer que le triangle  $OAB$  est rectangle et isocèle.
2.
  - a. Construire les points  $D$  et  $E$  et calculer leurs affixes  $z_D$  et  $z_E$ .
  - b. Montrer que les vecteurs  $\overrightarrow{OE}$  et  $\overrightarrow{AD}$  sont orthogonaux et que  $OE = AD$ .
3. Le but de cette question est de retrouver ce résultat dans un cas plus général. Il est inutile de refaire une figure.

Soient  $A, B, C, D$  et  $E$  les points d'affixe respectives non nulles  $z_A, z_B, z_C, z_D, z_E$  telles que

- Le triangle  $OAB$  est rectangle isocèle en  $O$  tel que  $(\overrightarrow{OA} ; \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}$  ;
  - Le triangle  $OCD$  est rectangle isocèle en  $O$  tel que  $(\overrightarrow{OC} ; \overrightarrow{OD}) = \frac{\pi}{2}$  ;
  - Le quadrilatère  $OBEC$  est un parallélogramme.
- a. Justifier les égalités suivantes :  $z_B = i z_A$  ;  $z_D = i z_C$  ;  $z_E = i z_A + z_C$ .
  - b. Montrer que :

$$\frac{z_D - z_A}{z_E} = i$$

- c. Interpréter géométriquement  $\left| \frac{z_D - z_A}{z_E} \right|$  et  $\arg\left(\frac{z_D - z_A}{z_E}\right)$  puis conclure.

**Exercice 3 : 5 points**

**Les questions 1 et 2 sont indépendantes.**

**1.** Une urne contient quatre boules rouges et deux boules noires indiscernables au toucher.

On prélève au hasard une boule de l'urne.

Si elle est rouge, on la remet dans l'urne et on prélève au hasard une seconde boule.

Si la première boule est noire, on prélève au hasard une seconde boule dans l'urne sans remettre la boule tirée.

**a.** Quelle est la probabilité que les boules tirées soient rouges ?

**b.** Calculer la probabilité que la seconde boule tirée soit noire.

Calculer la probabilité que la première boule soit rouge sachant que la seconde est noire.

**2.** Soit  $n$  un entier naturel supérieur ou égal à 1.

Une urne contient quatre boules rouges et  $n$  boules noires indiscernables au toucher.

On prélève successivement et au hasard quatre boules de l'urne en remettant dans l'urne la boule tirée après chaque tirage.

La variable aléatoire  $X$  donnant le nombre de boules rouges tirées au cours de ces quatre tirages suit la loi binomiale de paramètres 4 et  $p$ .

**a.** Donner l'expression de  $p$  en fonction de  $n$ .

**b.** Démontrer que la probabilité  $q_n$  que l'une au moins des quatre boules tirées soit noire est

telle que  $q_n = 1 - \left(\frac{4}{n+4}\right)^4$ .

**c.** Quel est le plus petit entier naturel  $n$  pour lequel la probabilité  $q_n$  est supérieure ou égale à 0,999 9 ?

#### Exercice 4 : 6 points

On considère la suite  $(I_n)$  définie pour  $n$  entier naturel non nul par :

$$I_n = \int_0^1 x^n e^{x^2} dx.$$

1. (a) Soit  $g$  la fonction définie par  $g(x) = x e^{x^2}$ .

Démontrer que la fonction  $G$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $G(x) = \frac{1}{2} e^{x^2}$  est une primitive de la fonction  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .

(b) En déduire la valeur de  $I_1$ .

(c) A l'aide d'une intégration par parties, démontrer que pour tout entier naturel  $n$ , supérieur ou égal à 1, on a :

$$I_{n+2} = \frac{1}{2} e - \frac{n+1}{2} I_n.$$

(d) Calculer  $I_3$  et  $I_5$ .

2. On considère l'algorithme suivant :

Initialisation	Affecter à $n$ la valeur 1 Affecter à $u$ la valeur $\frac{1}{2}e - \frac{1}{2}$
	Tant que $n < 21$ Affecter à $u$ la valeur $\frac{1}{2}e - \frac{n+1}{2}u$ Affecter à $n$ la valeur $n + 2$
Sortie	Afficher $u$

Quel terme de la suite  $(I_n)$  obtient-on en sortie de cet algorithme ?

3. (a) Montrer que pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $I_n \geq 0$ .

(b) Montrer que la suite  $(I_n)$  est décroissante.

(c) En déduire que la suite  $(I_n)$  est convergente. On note  $\ell$  sa limite.

4. *Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même infructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*

Déterminer la valeur de  $\ell$ .